

TRAITEMENT DE VERRUES

Quelle est la différence entre les deux traitements offerts?

Type de traitement	Azote liquide	Cantharidine
Il est recommandé de ne pas mettre d'onguent ou de crème sur la lésion avant, ni pendant le traitement. Avant d'appliquer le produit, l'infirmière doit débrider la lésion.		
Méthode d'application	Application de l'azote à l'aide d'un contenant sous pression	Application du liquide avec un coton tige ou autre tel qu'une seringue
Douleur	Douleur lors de l'application	- Aucune douleur lors de l'application - Une douleur tolérable peut survenir graduellement et pendant 24h après le traitement.
Principe d'action	Le produit brûle la lésion	
Effets secondaires	Réaction locale : rougeur, oedème, formation d'une cloque ou d'une croûte brunâtre (ne pas la retirer)	Réaction locale : rougeur, oedème, formation d'une cloque ou d'une croûte brunâtre (ne pas la retirer). Réaction allergique locale possible, mais rare ¹
Soins nécessaires à faire la maison après le traitement	Aucun traitement	- Ne pas mettre la lésion sous l'eau pendant 24 h - Aucun autre soin à faire à la maison - Ne pas gratter la lésion pour éviter les risques d'infection
Délai recommandé pour le suivi	15 jours	7 jours plus tard
	Nécessaire pour évaluer l'évolution et faire un autre traitement au besoin.	
Efficacité	<p>On ne peut prédire à l'avance le nombre de traitements nécessaires. Il faut parfois faire plusieurs traitements selon la situation. Lorsque nous jugerons que nous ne sommes plus en mesure de vous aider, nous vous référerons à un médecin.</p> <p>Vous pouvez en tout temps cesser le traitement en cours et consulter un autre professionnel de la santé.</p> <p>Il se peut que l'on doive vous référer à un autre professionnel de la santé s'il n'y a pas d'amélioration suite au traitement.</p> <p>Pour une meilleure efficacité, respecter le délai prévu pour le suivi selon le traitement.</p> <p>Le traitement est non définitif puisque la lésion est causée par un virus qui peut être développé à nouveau.</p>	

¹ Lors d'apparition de rougeur ou de douleur intense sur le site de la lésion, il faut retirer le pansement, passer la région sous l'eau pendant 15 minutes pour retirer le produit et consulter un médecin.

Consentement pour le traitement de verrues

Nom complet : _____ **Date de naissance :** _____

Consentement

- J'ai lu et compris l'information mentionnée dans le tableau remis expliquant la différence entre les deux traitements possibles.
- Je comprends que dans le but d'éviter une infection, je ne dois pas essayer de retirer la croûte qui se formera.
- Je comprends que l'infirmière ne peut garantir l'efficacité du traitement, ni savoir le nombre de traitements nécessaires.
- Je comprends que pour une meilleure efficacité, je dois faire les soins recommandés à la maison et respecter le délai pour le suivi (7 jours ou 15 jours selon le traitement choisi).
- Le prix de consultation pour le suivi de lésions est de 20\$ si aucun traitement n'est appliqué. Si un traitement est appliqué, le coût pour le traitement de 15 minutes est de 40\$.

Signature de la personne : _____ **Date :** _____

Signature du parent/tuteur : _____ **Date :** _____